COVID-19

VACINAÇÃO

REGRAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DAS PESSOAS COM COMORBIDADES

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, o grupo das pessoas com comorbidades será vacinado por idade - ou seja, do mais velho para o mais novo. **Pacientes com comorbidades, que fazem parte do grupo prioritário devem se dirigir até uma Unidade de Saúde e retirar a sua Declaração.** Essa declaração deve indicar uma das comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a covid, previstas no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação do Ministério da Saúde (veja a lista a seguir) e será emitida por profissional de saúde com Ensino Superior. De posse da declaração a pessoa será encaminhada ao setor de vacinação da unidade para a aplicação da vacina, se houver a disponibilidade de doses.

COMORBIDADES DEFINIDAS COMO PRIORITÁRIAS

GRUPO DE COMORBIDADES	DESCRIÇÃO
Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes.
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstru-tiva crônica (DPOC), fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconio- ses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoi- des sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR: quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas reco- mendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controladaem uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180mmHg e/ou diastólica ≥ 110mmHg, independentementeda presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg napresença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade
DOENÇAS CARDIOVASCULARES	

InsuficiênciaCardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em está-gios B, C ou D, independentemente de classe funcional da *New York HeartAssociation*.
Cor pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.
Cardiopatia hipertensiva	Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).
Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia is-quêmica, pós-Infarto Agudo do Miocárdio, outras).
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; esteno- se ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ouinsuficiência tricúspide, e outras).
Miocardiopatias e Pericardiopatias	Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica;cardiopatia reumática.
GRUPO DE COMORBIDADES	**DESCRIÇÃO**
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada(fibrilação e flutter atriais; e outras).
Cardiopatias congênitas no adulto	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxê-micas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.
Próteses valvarese Dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincroni-zadores, assistência circulatória de média e longa permanência).
Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmicotransitório; demência vascular.
OUTRAS COMORBIDADES	
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60ml/min/1,73m^2) e síndrome nefrótica.

Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV, independentemente da contagem de linfócitos T CD4+e que não foram vacinadas previamente contra a covid-19; doenças reu-máticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossu-pressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6meses; neoplasias hematológicas.
Anemia falciforme	Anemia falciforme.
Obesidade mórbida	Índice de Massa Corpórea (IMC) ≥ 40. 
Síndrome de Down, acima de 18 anos	Trissomia do cromossomo 21.
Cirrose hepática	Cirrose hepática *Child-Pugh* A, B ou C.

Além destas indicações clínicas descritas acima, as pessoas entre 18 e 59 anos, serão vacinadas se portarem:

- ✓ Gestante com comorbidades – mediante declaração;
- ✓ Doença renal crônica em diálise;
- ✓ Pacientes oncológicos em acompanhamento, acima de 18 anos, mediante comprovação e liberação de médico(a) oncologista;
- ✓ Pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), acima de 18 anos.

ORIENTAÇÕES PARA VACINAÇÃO (não será feito o agendamento nesse momento por meio do formulário eletrônico)

- ✓ Apresentar comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de comorbidades (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.);
- ✓ Apresentar documento de identificação com foto, CPF e Cartão Nacional do SUS;
- ✓ Apresentar comprovante de residência em Capanema;
- ✓ Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;
- ✓ Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.